

# 新型コロナワクチンの副反応について ～インフルエンザワクチンとの比較～

## 新型コロナ ワクチン

コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン

◆ 本邦の**20歳以上85歳以下**  
健康な成人の副反応

	1回目	2回目
①痛い	86.6%	79.3%
③頭痛	32.8%	44.0%
筋肉痛	14.3%	16.4%
関節痛	14.3%	25.0%
②疲れる	40.3%	60.3%
ふるえる	25.2%	45.7%
発熱 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$	14.3%	32.8%

◆ 本邦における**65歳以上**の方への  
接種は4月中旬から開始予定のため  
現段階で  
日本人高齢者の副反応の出現頻度は  
**わからない**

◆ **アナフィラキシー**の発生頻度

**国外**では  
100万人に**4.7人**程度  
(アメリカ疾病予防管理センター)  
∧  
**本邦**の**医療従事者**  
100万人に**81人**程度  
(2021/3/26 厚生労働省)

## インフルエンザ ワクチン

インフルエンザHAワクチン

◆ 本邦の**20歳以上**の  
健康な成人100例の副反応

	1回目	2回目
②痛い	35.0%	50.0%
頭痛	12.0%	15.0%
①赤くなる	38.0%	50.0%
腫れる	20.0%	32.0%
疲れる	17.0%	24.0%
鼻みず	7.0%	8.0%
③掻痒感	22.0%	37.0%

◆ 高齢者施設入所・病院入院中の**65歳以上**  
日本人高齢者3381例 1回接種後の副反応

**疼痛 2.3%** **発赤 13.3%**  
**腫脹 4.5%** **発熱 0.8%**

(インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」添付文書参照)

◆ **アナフィラキシー**の発生頻度

**本邦**では  
100万人に**1.4人**程度

\*日本人に対する新型コロナウィルスワクチン  
についてはまだ不明な点も多く(特に副反応)、  
暫定的な情報です。医療機関さまにおかれま  
しては必ず最新の一次情報を確認下さいます  
ようお願い申し上げます。



米満内科  
2021年4月12日