

Gemüse-ABC

von Sven Wachtmann
Vorstandsmitglied für Fachberatung

Artischocke

(*Cynara cardunculus*,
Cynara scolymus)

FAMILIE Korbblütler (Asteraceae),
Distelgewächs

ARTEN/SORTEN ca. 10 Arten

HERKUNFT Mittelmeerraum, Nordafrika

AUSSAAT Februar bis März

AUSSAATTIEFE 0,5 cm

PFLANZUNG April–Mai

PFLANZABSTAND 80 x 100 cm

ERnte Oktober–November (wenn die Blüten-
körbe voll entwickelt sind, aber noch nicht
zu blühen beginnen)

FRUCHT Blütenstand kann verzehrt werden,
fleischige Hüllblätter

STANDORT sonnig; anspruchslos beim Boden

ALTER mehrjährig

HÖHE 80–200 cm

WINTERSCHUTZ nach
der Ernte ca. 10 cm
über dem Boden ab-
schneiden und mit ei-
ner Schicht Laub gegen
Frost abdecken

SCHÄDLINGE/KRANKHEITEN
Schwarze Bohnenlaus,
Wühlmaus

Aubergine

(*Solanum melongena*)

FAMILIE Nachtschattengewächse
(Solanaceae)

ARTEN/SORTEN in div. Farb- und Formvarianten

HERKUNFT Asien, Indien

AUSSAAT ab Ende Januar Vorkultur

AUSSAATTIEFE 1–2 cm

PFLANZUNG Februar–Mai (Abstand: 50–60 cm)

PFLANZABSTAND 50 x 50 cm

ERnte August–Oktober (wenn die Frucht
weich wird)

FRUCHT fleischige, bis zu 30 cm lange tropfen-
förmig Frucht; die Färbung der Frucht kann
von weiß, gelb-weiß, schwarz-violette bis
zu gestreift sein

STANDORT sonnig und windgeschützt, benöti-
gen viel Wärme, lockeren und humusreichen
Boden

ALTER einjährig

HÖHE 70–100 cm

WINTERSCHUTZ nach der Ernte ca. 10 cm
über dem Boden abschneiden und mit
einer Schicht Laub gegen Frost abdecken

SCHÄDLINGE/KRANKHEITEN Blattläuse,
Weiße Fliege, Grauschimmel

