

Gemüse-ABC

von Sven Wachtmann
Vorstandsmitglied für Fachberatung

Radieschen

(*Raphanus sativus* var. *sativus*)

FAMILIE Kreuzblütler (*Brassicaceae*)

ARTEN/SORTEN Gewächshaus- und Freiland-
sorten

HERKUNFT Nordwesteuropa

AUSSAAT ab Ende März

AUSSAATTIEFE 1 cm

PFLANZUNG März bis August

PFLANZABSTAND 5 cm x 15 cm

ERNTE April bis Oktober
(nach 3 bis 4 Wochen)

FRUCHT Knollen können je nach Sorte weiß,
rot, violett, gelb oder rot-weiß sein;
die Form rund, oval oder zylindrisch

STANDORT sonnig; locker durchlässiger,
humoser Boden

ALTER einjährig

HÖHE 10 cm

WINTERSCHUTZ leichter Nachtfrost nach
der Aussaat richtet unter den jungen
Pflanzen keinen Schaden an

SCHÄDLINGE Rettichschwärze,
Kohlerdföhe, Kohl- und
Rettichfliege

Rosenkohl

(*Brassica oleracea* var. *gemmifera*)

FAMILIE Kreuzblütler (*Brassicaceae*)

HERKUNFT Mittelmeerraum

AUSSAAT Mitte März bis Ende April

AUSSAATTIEFE 0,5–1 cm

PFLANZUNG April bis Juni

PFLANZABSTAND 60 cm x 40 cm

ERNTE Oktober bis März

FRUCHT mehre kleine Röschen bis
zu 55 Röschen an einem Stück

STANDORT sonnig, höherer Nährstoffbedarf

ALTER einjährig

HÖHE 30–100cm

WINTERSCHUTZ kann bis zu -15°C aushalten,
Wintergemüse

SCHÄDLINGE Erdflöhe, Blattläuse