

Gemüse-ABC

von Sven Wachtmann
Vorstandsmitglied für Fachberatung

Tomate

(*Lycopersicon esculentum*)

FAMILIE: Nachtschattengewächse
(*Solanaceae*)

ARTEN/SORTEN: unzählige Sorten in unterschiedlichen Formen wie Fleischtomate, Kirschtomate, Strauchtomate, Flaschentomate, Eiertomate, Cockailtomate, Wildtomate

HERKUNFT: Mittel- und Südamerika

AUSSAAT: Mitte März, März bis April im Gewächshaus

AUSSAATTIEFE: ca. 1 cm

PFLANZUNG: ab Mitte Mai im Freiland

PFLANZABSTAND: 50 cm x 50 cm

ERNTE: Juli bis Oktober (nach 15 Wochen)

FRUCHT: je nach Sorte scharlachrot, orange-farben, grün, violette bis zu fast schwarz aber auch mehrfarbig

STANDORT: sonnig und warm
(Temperatur 12–bis 25 °C)

ALTER: einjährig

HÖHE: 50–150 cm

WINTERSCHUTZ: nicht winterhart

KRANKHEITEN/SCHÄDLINGE: Bakterienwelke, Stängelfäule, Kraut- und Braunfäule, Grünkragen, Blütenendfäule, Wurzelgallenälchen, Blattläuse

Zwiebel

(*Allium cepa*)

FAMILIE: Lauchgewächse (*Alliaceae*)

VARIETÄTEN: Perlzwiebel, Schalotten, Silberzwiebel, Küchenzwiebel

HERKUNFT: Mittleren Osten, Pakistan, Afghanistan, Iran

AUSSAAT: April (Sommerzwiebel), August (Winterzwiebel)

AUSSAATTIEFE: 1–2 cm

PFLANZUNG: März bis April

PFLANZABSTAND: 10 x 20 cm

ERNTE: Juli bis August (Sommerzwiebel), ab Mai (Winterzwiebel)

FRUCHT: Zwiebel von flacher, runder, birnenförmig bis längliche Form, Farbe reicht von rotviolett über rosa, braun, gelb bis zu weiß

STANDORT: sonnig, humusreich, kalkhaltigen Boden

ALTER: zweijährig

HÖHE: 30–50 cm

WINTERSCHUTZ: ist widerstandsfähig gegen Kälte und erträgt Fröste bis zu –15 °C

KRANKHEITEN/SCHÄDLINGE: Falscher Mehltau, Grauschimmelfäule, Zwiebelälchen, Blattläuse, Zwiebelfliege, Zwiebelminierfliege, Lauch- oder Zwiebelmotte