PROGRAMMA DI ESERCIZIO E CEFALEE

In pazienti con cefalea primaria,
la **terapia farmacologica**
spesso è l'approccio principale,
anche se, nel lungo periodo

l'abuso di farmaci **potrebbe**
giocare un ruolo nella
cronicizzazione della stessa.

Un programma di **esercizio**,
può ridurre **l'uso eccessivo** o
diventare una vera e propria
modalità alternativa di gestione

essendo in grado di ridurre
intensità, frequenza e durata
degli attacchi

COM'È POSSIBILE ?

- rilascio di **mediatori oppioidi** (serotonina):
componenti importanti del sistema di **inibizione discendente del dolore**

- rilascio di **endorfine**:
“ormoni del benessere” che contribuiscono a ridurre la percezione del dolore

EMICRANEA

- Attività aerobica
- per almeno 30 minuti
- intensità moderata (60-80% della FCmax)

produce un'inibizione del dolore post-esercizio e una riduzione della frequenza degli attacchi.

È stato anche notato che:

- allenamento di forza
- 60 min totali a settimana
- Indipendentemente dalla distribuzione settimanale

può condurre ad una riduzione della frequenza ed intensità degli attacchi

CEFALEA TENSIVA

L'allenamento di forza sembra essere più efficace rispetto a quello aerobico, nella riduzione dei sintomi

- allenamento di forza
- 12 settimane: 2 volte a settimana per le prime 6 sett. e 3 volte per altre 6 sett.
- intensità 7/10 (scala Borg)

- esercizi isometrici di stabilizzazione cervicale, 6 sec. per 8 volte
- esercizi di rinforzo degli arti superiori con elastici

- Un programma di **esercizio** può aiutare la **riduzione dei sintomi nelle cefalee primarie** in termini di intensità, frequenza e durata degli attacchi
- Questa opzione terapeutica si dimostra essere significativa anche per **ridurre l'utilizzo di farmaci**