

Gemüse-ABC

von Sven Wachtmann
Vorstandsmitglied für Fachberatung

Rettich

(*Raphanus sativus*)

- FAMILIE:** Kreuzblütler (*Brassicaceae*)
- ARTEN/SORTEN:** Ackerrettich, Herbstrettich, unzählige Sorten
- HERKUNFT:** China, Ägypten
- AUSSAAT:** März bis August
- AUSSAATTIEFE:** 2–3 cm
- PFLANZUNG:** März bis Mai
- PFLANZABSTAND:** 20–30 cm x 20 cm
- ERNTE:** Mai bis August
- FRUCHT:** weiße, rotweiße, rote, rotviolette, gelbe oder schwarze Wurzeln
- STANDORT:** sonnig; humosen, leichten sandigen Boden
- ALTER:** einjährig (zweijährig sind Wintersorten)
- HÖHE:** 20–60 cm
- WINTERSCHUTZ:** Herbstrettiche ertragen Minusgrade bis etwa -9°C
- SCHÄDLINGE:** Rettichschwärze, Kohlerdföhe, Kohl- und Rettichfliege

Rhabarber

(*Rheum rhabarbarum*)

- FAMILIE:** Knöterichgewächse (*Polygonaceae*)
- SORTEN:** weit über 100
- HERKUNFT:** arabischen Raum
- AUSSAAT:** –
- AUSSAATTIEFE:** –
- PFLANZUNG:** September bis Oktober oder zeitiges Frühjahr
- PFLANZABSTAND:** Eine Pflanze auf einem Quadratmeter, 100 x 100 cm
- ERNTE:** ab April bis 24. Juni; bei jedem Erntegang kann man ca. fünf Stiele je Pflanze entnehmen
- FRUCHT:** Blattstiele
- STANDORT:** sonnig bis Halbschatten; mittelschwerer, lockerer, humoser Boden
- ALTER:** mehrjährig; Staude
- HÖHE:** 20–60 cm
- WINTERSCHUTZ:** nicht erforderlich
- SCHÄDLINGE:** Blattfleckenkrankheit